



ZIEGLER
Homöopathika ad us. vet.

Natürlich bewährte Tierarznei

Gebrauchsinformation

HÄMO- logoplex®

Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Homöopathisches Arzneimittel
Für Tiere**

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe,
Ziegen, Hunde, Katzen, Heimtiere

**Pharmazeutischer Unternehmer und
Hersteller:**

ZIEGLER GmbH, Ötzer Str. 10, 86672 Thierhaupten,
Telefon: 08271-813111, Telefax: 08271-813112

Darreichungsform und Inhalt:

Flüssige Verdünnung zur Injektion, 100 ml.

Zusammensetzung:

10 g (=10 ml) Flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Wirkstoffe: Achillea millefolium Dil. D6 1,0 g, Hamamelis virginiana Dil. D6 1,0 g, Phosphorus Dil. D12 1,0 g. Sonstige Bestandteile: Methyl-4-hydroxybenzoat, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen. Bei fortdauernden Krankheitssymptomen während der Anwendung ist medizinischer Rat einzuholen.

Wechselwirkungen:

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn **HÄMO-logoplex®** gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Zur Verträglichkeit von **HÄMO-logoplex®** bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:

Zur subkutanen Injektion. Entsprechend Tierart und Körpergewicht (KGW) beträgt die Einzeldosis:

Pferd, Rind 10 ml

Kalb, Schwein 5 ml

Schaf, Ziege. max. 3 ml

Ferkel 0,2 ml pro kg KGW (max. 3 ml pro Tier)

Hund. 0,2 ml pro kg KGW (max. 3 ml pro Tier)

Katze, Heimtiere. . . 0,2 ml pro kg KGW (max. 1 ml pro Tier)

Je nach Ausprägung einer Blutung bzw. Verlauf kann die angegebene Dosis bei akuten oder perakuten Situationen in Abständen von 5-10 Minuten verabreicht werden. Bei Besserung erfolgt die Arzneigabe in 30 bis 60-minütigem Abstand. Nicht länger als bis zur vollständigen Heilung des Tieres.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Wartezeit:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege

Essbare Gewebe 0 Tage

Pferd, Rind, Schaf, Ziege

Milch 0 Tage

Besondere Lagerungshinweise:

Nicht über 25°C lagern. Nach Anbruch 28 Tage haltbar. 28 Tage nach Anbruch im Behältnis verbleibende Reste sind zu verwerfen. Das Arzneimittel nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr anwenden. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Nach dem ersten Öffnen haltbar bis: _____

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage:

Juli 2019

Weitere Angaben:

Apothekenpflichtig

Handelsform:

5x 100 ml

1x 100 ml

Hinweise für Anwender:

In der vet.-hom. Literatur werden die Bestandteile dieses Arzneimittels u.a. beschrieben bei: Blutstillung (arteriell / venös), erhöhter Blutungsneigung, Blutmelken.